



Gryfino, dnia 14 listopada 2014 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W GRYFINIE

Krzysztof Dankiewicz

		Hodowcy drobiu nioski , reprodukcja	
Nasz znak:	PIW. Z 408/ / / 2014		
Dot. sprawy nr:		pismo z dnia:	

W związku z informacją o stwierdzeniu wirusa ptasiej grypy (szczep typu H5N8) na terenie Niemiec – Pomorze Przednie - kraj związkowy Meklemburgia Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gryfinie prosi o wzmożenie czujności i reagowanie w przypadku upadków drobiu – zwiększone upadki drobiu.

Specjaliści przypominają , że wirus ptasiej grypy nie stanowi poważnego zagrożenia dla ludzi o ile przestrzegane są podstawowe zasady higieny (mycie rąk, mycie naczyń, obróbka ciepła mięsa drobiowego w temperaturze min. 70 st.Celsjusza, unikanie kontaktu surowego mięsa drobiowego z inną żywnością).

Grupa podwyższonego ryzyka to osoby mające kontakt bezpośredni z ptactwem hodowlanym lub dzikim.

Podtyp wirusa H5N8 należy do niebezpiecznych dla drobiu i może przyczynić się do wysokiej śmiertelności ptaków.

Informacje wstępne:

Głównym źródłem zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt (drobiu) są dzikie ptaki, będące bezobjawowymi nosicielami wirusa grypy ptaków.

Objawy kliniczne grypy ptaków u drobiu są mało charakterystyczne i różnicowane w zależności od zjadliwości szczepu wirusa wywołującego chorobę,



gatunku i wieku ptaków, zakażeń towarzyszących oraz warunków środowiskowych.

Główne objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu to depresja, gwałtowny spadek lub utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonek, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczołowych, kichanie, duszność, biegunka.

Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%. Przy zakażeniu wirusem grypy o niskiej zjadliwości mogą wystąpić objawy ze strony układu oddechowego (z reguły łagodne), depresja, biegunka, **zmniejszona produkcja jaj u niosek**. Zakażone ptaki wydają duże ilości wirusa z kałem, w wydzielinie z oczu i dróg oddechowych. Najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia drobiu domowego jest bezpośredni lub pośredni kontakt z wędrującymi ptakami dzikimi, zwykle ptactwem wodnym. Rozprzestrzenienie wirusa może następować również poprzez zanieczyszczoną paszę, wodę, nawóz, sprzęt i środki transportu. Bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu wirusa grypy odgrywa człowiek, który poprzez zanieczyszczone ubranie, obuwie, sprzęt i **produkty (jaja)** może przyczynić się do rozprzestrzeniania choroby. Rozprzestrzenianie z wiatrem zainfekowanych cząstek i kropelek nie ma większego znaczenia.

Wirus grypy ptaków może zachowywać aktywność w środowisku kurnika przez 5 tygodni, zatem istotne jest przy podejrzeniu lub stwierdzeniu choroby, zabezpieczenie pomieszczeń, sprzętu, nawozu oraz dokładne ich oczyszczenie i odkażenie. Wirusy grypy są wrażliwe na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne oraz detergenty. Niszczy go również obróbka termiczna (smażenie, gotowanie).

Zalecenia dla przemysłowych producentów drobiu

Zaleca się:

1. unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
2. ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karmia dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób; ograniczenie liczby osób obsługujących fermę do koniecznego minimum wraz ze sprawdzeniem czy osoby te nie utrzymują drobiu we własnych zagrodach;
3. rozłożenie przed wejściami do budynków fermy drobiu mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym;
założenie słuz dezynfekcyjnych w wejściach do budynków fermy drobiu;



Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Armii Krajowej 78, 74-100 Gryfino

tel.: (91) 416-22-74, fax: (91) 416-24-92, e-mail: gryfino.piw@wetgiw.gov.pl, www.piwgryfino.pl



Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Armii Krajowej 78, 74-100 Gryfino

tel.: (91) 416-22-74, fax: (91) 416-24-92, e-mail: gryfino.piw@wetgiw.gov.pl, www.piwgryfino.pl